

فرم ترجمان دانش دانشکده پرستاری پلدختر

عنوان خبر پیشنهادی:

بیماران مبتلا به کووید-۱۹ بستری نسبت به بیماران سرپایی وضعیت و شرایط بدتری را تجربه می کنند

اهمیت موضوع:

امروزه مدیریت بیماری کووید-۱۹ توسط دولتها با توجه به منابع محدود مشکل می باشد. یکی از راههای مناسب جهت مدیریت بیماری آشنایی با مشخصات بیماران و عوامل خطر بیماری می باشد.

مهمترین یافته ها:

بیماران بستری سن بالاتر، سابقه بیماریهای زمینه ای بیشتر و سابقه مصرف آسپرین بالاتری داشتند. سرفه شایعترین علامت در همه بیماران بود. در بیماران بستری ضعف و خستگی و در بیماران سرپایی سرفه شایع ترین علامت بودند. درصدی از بیماران، حتی بیماران بستری، در ابتدا بدون علامت بوده و فقط به علت تماس با بیماران مبتلا مراجعه نموده بودند. میزان مرگ و میر و بستری در بخش مراقبتهای ویژه در بیماران بستری بیشتر بود.

پیشنهاد برای کاربرد نتایج:

با توجه به نتایج مطالعه پیشنهاد می شود:

- ۱- در ارزیابی و تصمیم گیری در خصوص شدت بیماری کووید-۱۹ فقط به علایم بالینی در هنگام مراجعه توجه نشده و سایر خصوصیات بیماران نیز در نظر گرفته شود.
- ۲- توجه به بیماران بستری از نظر احتمال وخامت شریط و خطر مرگ و میر بیشتر ضروری است.
- ۳- حتی بیماران فاقد علامتی که تنها به دلیل تماس با بیماران مبتلا مراجعه نموده اند نیز باید به دقت بررسی و پیگیری شوند.